

AMMELTZ (Solution avec applicateur) (HK-00349)

Flacon applicateur de 82ml.



<i>Methyl salicylate</i>	<i>5000 mg</i>
<i>Thymol</i>	<i>700 mg</i>
<i>l-Menthol</i>	<i>5200 mg</i>
<i>dl-Comphor</i>	<i>5200 mg</i>
<i>Nonivamide(vanillylamide nonylate)</i>	<i>10 mg</i>

Composition pour 100ml.

Indication(s) :

Traitement d'appoint des douleurs musculaires et des entorses.

Voie d'administration :

Usage externe. En application locale.

Posologie :

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans : Appliquer sur la zone douloureuse puis masser localement, 2 à 3 fois par jour.

Précaution(s) d'Emploi :

Bien se laver les mains après application.
Tenir éloigné des flammes.

Contre-indication(s) :

Ne pas utiliser sur l'enfant de moins de 6 ans.
Ne pas utiliser sur la femme enceinte ou allaitante.
Ne pas utiliser en cas d'antécédent d'allergie aux salicylés.
Ne pas utiliser chez l'enfant ayant des antécédents de convulsion fébriles ou non.
Ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion infectée ou une plaie, ni sous pansement occlusif.

Effet(s) indésirable(s) :

En raison de la présence de dérivés terpéniques (camphre, menthol) et, en particulier, en cas d'administration supérieure aux doses préconisées ou de non-respect des conseils d'utilisation, agitation confusion peuvent survenir chez les sujets âgés, ainsi que des convulsions chez l'enfant.
Rougeur au point d'application.

Fabriqué par:

**Sendai kobayashi pharmaceutical Co.,LTD
4-3,matsusakadaira,Taiwa-cho,Kurokawa-gun,Miyagi,
Japon**