

HUA TUO ANTI-CONTUSION RHEUMATISM PLASTER



Boîte de 5 pansements de 10x6cm

<i>Moschus</i>	0.03%	<i>Rhizoma kaempferiae</i>	5%	<i>Oleum cinnamomi</i>	1%
<i>Mastix</i>	2%	<i>Cortex acanthopanacis radicis</i>	5%	<i>Oleum menthae</i>	3%
<i>Myrrha</i>	2%	<i>Rhizoma drynariae</i>	5%	<i>Excipient add to</i>	100%
<i>Radix pseudoginseng</i>	2%	<i>Glechoma hederacea</i>	5%		
<i>Flos carthami</i>	2%	<i>Radix angelicae tuhao(radix angelicae pubescentis)</i>	2%		
<i>Radix sileris</i>	5%	<i>Rhizoma zingiberis</i>	5%		
<i>Herba schizonepetae</i>	5%	<i>Borneolum</i>	2%		
<i>Radix angelica</i>	5%	<i>Oleum caryophylli</i>	0.5%		

Indication(s) :

Traitement d'appoint des douleurs musculaires, rhumatismales, et des sciatiques.

Voie d'administration :

Usage externe. En application locale.

Posologie :

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans : Appliquer sur la zone douloureuse 1 fois par jour.

Précaution(s) d'Emploi :

Bien se laver les mains après application.

Contre-indication(s) :

Ne pas utiliser sur l'enfant de moins de 6 ans.
Ne pas utiliser sur la femme enceinte ou allaitante.
Ne pas utiliser chez l'enfant ayant des antécédents de convulsion fébriles ou non.
Ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion infectée ou une plaie.

Effet(s) indésirable(s) :

En raison de la présence de dérivés terpéniques (Bornéol, menthol) et, en particulier, en cas d'administration supérieure aux doses préconisées ou de non-respect des conseils d'utilisation, agitation confusion peuvent survenir chez les sujets âgés, ainsi que des convulsions chez l'enfant.
Rougeur au point d'application.

Fabriqué par:

**Guanghou Jingxiutang Pharmaceutical Co.
Guangdong, China**