

TIEH TA WAN (82)f1-043



Boite de 1 pâte de 12,5g.

<i>Pollen typhae</i>	10%
<i>Radix saussureae</i>	15%
<i>sanguis draconis</i>	10%
<i>myrrha</i>	10%
<i>radix angelicae sinensis</i>	15%
<i>Flos carthami</i>	10%
<i>radix pseudoginseng</i>	8%
<i>mastix</i>	10%
<i>pveichii lynch(Radix paeoniae rubra)</i>	12%

Indication(s) :

Contusions, foulure.

Voie d'administration :

Voie Orale ou usage externe.

Posologie :

* Voie Orale :

Adulte : 1 pâte 1 fois par jour à dissoudre dans un peu d'eau tiède.

Enfants de 6 à 15 ans : ½ pâte 1 fois par jour à dissoudre dans un peu d'eau tiède.

* Usage externe :

Dissoudre 1 pâte dans un peu d'eau tiède et appliquer sur la zone concernée 3 à 4 fois par jour.

Précaution(s) d'Emploi :

En usage externe, ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion infectée ou une plaie, ni sous pansement occlusif.

Contre-indication(s) :

Ne pas donner aux patients traités par anti-coagulants.

Ne pas donner à la femme enceinte ou allaitante.

Ne pas donner à l'enfant de moins de 6 ans.

Fabriqué par:
**The united pharmaceutical manufactory,
Kwangchow, CHINA**