

TOKUHON MEDICAL PLASTER (HK10063)



Boîte de 12 pansements 6,5 x 4,2cm

<i>menthol</i>	<i>10,5g</i>
<i>methyl salicylate</i>	<i>11,2g</i>
<i>camphor</i>	<i>1,8g</i>
<i>tocopherol</i>	<i>2,5g</i>
<i>glycol salicylate</i>	<i>3,0g</i>

Composition pour 1m².

Indication(s) :

Traitement local d'appoint des douleurs musculaires, des contusions et des foulures.

Voie d'administration :

Usage externe. En application locale.

Posologie :

Réservé à l'adulte : Appliquer sur la zone douloureuse 1 fois par jour.

Précaution(s) d'Emploi :

Bien se laver les mains après application.

Contre-indication(s) :

Ne pas utiliser sur l'enfant de moins de 15 ans.
Ne pas utiliser sur la femme enceinte ou allaitante.
Ne pas utiliser en cas d'antécédent d'allergie aux salicylés.
Ne pas utiliser chez l'enfant ayant des antécédents de convulsion fébriles ou non.
Ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion infectée ou une plaie.

Effet(s) indésirable(s) :

En raison de la présence de dérivés terpéniques (camphre, menthol) et, en particulier, en cas d'administration supérieure aux doses préconisées ou de non-respect des conseils d'utilisation, agitation confusion peuvent survenir chez les sujets âgés, ainsi que des convulsions chez l'enfant.
Rougeur au point d'application.

Fabriqué par:

Tokuhon Corporation - Japon
41-2, Nihonbashi-Hancho, Chuo-Ku, Tokyo, Japon