

ZHENG GU SHUI golden HK 19985786T



Flacon de 88ml de solution avec applicateur.

<i>Rhizoma polygoni cuspidati</i>	7%	<i>Calophyllum membranaceum</i>	6%	<i>Camphor</i>	5%
<i>Schisandra henryi clarke</i>	7%	<i>Rhizoma curcumae</i>	6%	<i>Radix angelicae pubescentis</i>	4%
<i>Radix millettiae pulchrae</i>	7%	<i>Securidaca inappendiculata hassk</i>	5%	<i>Radix cyathulae</i>	4%
<i>Radix cynanchi paniculati</i>	7%	<i>cortex periplocae</i>	5%	<i>Radix et rhizoma ardisiae gigantifoliae</i>	4%
<i>Piper wallichii(miq) hand.-mazz</i>	6%	<i>Gnetum montanum markgr</i>	5%		
<i>Kadsura coccinea lem. A.c. smith</i>	6%	<i>radix angelicae dahuricae</i>	5%		
<i>Cudrania cochinchinensis(lour)</i>	6%	<i>menthol</i>	5%		

Indication(s) :

Traitement local d'appoint des douleurs musculaires , rhumatismales et des contusions.

Voie d'administration :

Usage externe. En application locale.

Posologie :

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans : Appliquer 2 à 3 fois par jour sur la zone douloureuse puis masser localement, avant ou après l'effort.

Précaution(s) d'Emploi :

Bien se laver les mains après application. Tenir éloigné des flammes.

Contre-indication(s) :

Ne pas utiliser sur l'enfant de moins de 6 ans.
Ne pas utiliser sur la femme enceinte ou allaitante.
Ne pas utiliser chez l'enfant ayant des antécédents de convulsion fébriles ou non.
Ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion infectée ou une plaie, ni sous pansement occlusif.

Effet(s) indésirable(s) :

En raison de la présence de dérivés terpéniques (Camphre, menthol) et, en particulier, en cas d'administration supérieure aux doses préconisées ou de non-respect des conseils d'utilisation, agitation confusion peuvent survenir chez les sujets âgés, ainsi que des convulsions chez l'enfant.
Rougeur au point d'application.

Fabriqué par:

Guangzi Yulin Pharmaceutical Co.,Ltd
Guangxi China